

HERBICIDA

BECTRA 48 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3315

BECTRA 48 SC, herbicida suelo activo con acción al follaje, de contacto y residual recomendado para el control selectivo de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Metribuzina (*)	48% p/v (480 g/l)
Cofomulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)

(*) 4-amino-6-*tert*-butil-4,5-dihidro-3- metiltio -1,2,4-triazin-5-ona

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

BECTRA 48 SC, es un herbicida suelo activo, en base a metribuzina perteneciente al grupo químico de las 1,2,4-Triazinonas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y manipulación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

BECTRA 48 SC, es ligeramente tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para aves y microcrustáceos acuáticos y prácticamente no tóxico para peces.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >> << NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >> << NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >> << REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. >> <<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para el triple lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: quitar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua de la llave. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia fría y corriente por al menos 15 minutos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si hubiese dificultad respiratoria, practicar respiración artificial boca a boca. En caso de ingestión: NO inducir vómito. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de intoxicación: anorexia, debilidad, salivación, somnolencia, espasmos musculares.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfono de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **BECTRA 48 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, reguladores de crecimiento o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

V20190217



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

BECTRA 48 SC, herbicida suelo activo con acción al follaje, de contacto y residual.

BECTRA 48 SC, puede ser aplicado en la pre-emergencia del cultivo, después de la siembra o en la post-emergencia o trasplante del cultivo en forma selectiva, dirigiendo la aspersión sólo al follaje de las malezas.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
PAPAS	MALEZAS DE HOJA ANCHA: Alfilerillo, Bledo, Bolsita del pastor, Calabacillo, Chamico, Diente de león, Duraznillo, Enredadera, Porotillo, Gallito, Hierba de la culebra, Manzanilla, Manzanilla hedionda, Mostaza, Mostacilla, Ñilhue, Ortiga, Pasto pinito, Pichoga, Quilloy-quilloy, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Senecio, Siete venas, Verónica, Viola, Pensamiento, Yuyo.	0,5 - 0,75 ó 1,0 - 1,5	Tratamiento de Pre-emergencia. Aplicar después de la aporca y antes de la emergencia del cultivo, en suelo liviano, de bajo contenido de materia orgánica o arcilla 0,5 a 0,75 L/ha. En suelo pesado o de alto contenido de arcilla o materia orgánica 1,0 a 1,5 L/ha. En papa de piel blanca aplicar sólo en Pre-emergencia..
		0,5 - 0,75	Tratamiento de Post-emergencia. Aplicar antes de que las malezas alcancen 2,5 cm de altura y con brotes de 5-10 cm como máximo. Carencia: 60 días.
TOMATE (Siembra directa)	Alfilerillo, Bledo, Bolsita del pastor, Calabacillo, Chamico, Diente de león, Duraznillo, Enredadera, Porotillo, Gallito, Hierba de la culebra, Manzanilla, Manzanilla hedionda, Mostaza, Mostacilla, Ñilhue, Ortiga, Pasto pinito, Pichoga, Quilloy-quilloy, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Senecio, Siete venas, Verónica, Viola, Pensamiento, Yuyo.	0,5 - 1,2	Tratamiento de Pre-emergencia. Aplicar inmediatamente después de la siembra. Regar después de aplicar. En aplicaciones localizadas en la hilera de siembra usar ancho mínimo de 40 cm y reducir la dosis/ha proporcionalmente al área efectivamente tratada. No aporcar después de aplicado el herbicida
		0,75 - 1,2	Tratamiento de Post-emergencia. Aplicar cuando las plantas tengan 4 a 6 hojas. Carencia: 7 días..
TOMATE (Transplante)	Alfilerillo, Bledo, Bolsita del pastor, Calabacillo, Chamico, Diente de león, Duraznillo, Enredadera, Porotillo, Gallito, Hierba de la culebra, Manzanilla, Manzanilla hedionda, Mostaza, Mostacilla, Ñilhue, Ortiga, Pasto pinito, Pichoga, Quilloy-quilloy, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Senecio, Siete venas, Verónica, Viola, Pensamiento, Yuyo.	0,75 - 1,2	Tratamiento de Pre-transplante. La aplicación debe realizarse una semana antes del transplante y luego incorporar a 5 cm de profundidad. En tratamiento de Post-transplante aplicar después de 10 a 15 días con plantas totalmente establecidas. No aplicar otro producto antes de 24 horas de aplicado el herbicida ni en mezcla con otro producto. Volumen: 300 L de agua/ha. No usar Bectra bajo condiciones de invernadero. Carencia: 7 días
ESPÁRRAGO VERDE	MALEZAS GRAMÍNEAS: Ballica, Bromo, Hualcacho, Maicillo de semilla, Pega-pega, Poa, Piojillo.	1,0 - 2,0	Se puede aplicar en esparragueras establecidas, como tratamientos post vegetacional; luego del corte de la parte aérea y un mes antes de la emergencia de los turiones. Si no llueve incorporar con rastraje superficial, solo en el sentido de la hilera sin compactar la banda de plantación. Carencia: 14 días.
ESPÁRRAGO BLANCO		1,0 - 2,0	Aplicar luego de la aporca. Volumen: 300 L/ha. Carencia 14 días.
ALFALFA ESTABLECIDA		0,8 - 2,2	Aplicar en otoño-invierno durante el periodo de dormancia. No usar más de 1,5 lt/ha en suelos de bajo contenido de materia orgánica y no menos de 1,0 L/ha en suelos con más de 2 % de materia orgánica. Volumen 200-400 L de agua/ha. Carencia: 28 días.
LUPINO		1,0 - 1,5	Aplicar de Pre-emergencia del cultivo, con buena humedad del suelo. Al cubrir toda la superficie utilizar volumen de 400 L de agua/ha. Carencia: 60 días.

Instrucciones de uso:

- Las dosis de **BECTRA 48 SC**, deben ajustarse de acuerdo al tipo de suelo y al contenido de materia orgánica. En suelos arenosos o de bajo contenido de materia orgánica usar las dosis más bajas y en suelos pesados y de alto contenido de materia orgánica, usar las dosis más altas del rango.
- BECTRA 48 SC**, no debe usarse en suelos arenosos o con menos de 0.5 % de materia orgánica.
- BECTRA 48 SC**, necesita suelo húmedo para incorporarse, por esta razón los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre suelo húmedo o con lluvias o riego hasta dos semanas después de su aplicación.
- En papa y tomate aplicar un máximo de 2 veces por temporada con un intervalo de 30 días entre una aplicación y otra, para el resto de los cultivos aplicar una vez por temporada.

Preparación de la mezcla:

Utilizar equipos sólo para tratamiento de herbicidas. Lave profusamente el estanque del equipo aplicador. Poner el estanque hasta la mitad con agua y agregue la dosis recomendada **BECTRA 48 SC**, luego completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina. **BECTRA 48 SC**, es compatible con otros herbicidas aplicados al suelo: Trifluralina, Metaloclor, Alaclor, Spectro 33 EC, Rango 480 SL y fertilizantes líquidos. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

Fitotoxicidad:

En postemergencia puede existir algún grado de fitotoxicidad al aplicar sobre papas o tomates, cuando la tasa de crecimiento del cultivo ha sido baja. En tomates las variedades precoces son más sensibles que las tardías. En papa verificar tolerancia varietal.

Puede causar fitotoxicidad en crucíferas, cucurbitáceas, lechugas, cebollas, remolacha, maravilla, frutillas, tabaco y lino. No plantar o sembrar otros cultivos antes de 4 meses posteriores a su aplicación.

Tiempo de reingreso:

12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



CUIDADO

