BROTTADOR

INDUCTORES SÓLIDOS – SOLID INDUCTORS

ABONO CON AMINOÁCIDOS (UREA 42% N) CON MICRONUTRIENTES. BORO (B), COBRE (Cu), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo), ZINC (Zn) PARA APLICACIÓN FOLIAR

Nitrógeno (N) Total	42,2% p/p
Aminoácidos libres	2% p/p
Boro (B) soluble en agua	0,02% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua	0,02% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,02% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,005% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,02% p/p
pH (1%)	6
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada:	3-10
Agente Quelante:	EDTA

DESCRIPCIÓN

BROTTADOR es un activador del crecimiento de acción muy rápida especialmente indicado en fases de brotación. Su alto contenido en nitrógeno ureico libre de biuret, su equilibrada composición en micros quelatados, especialmente el calcio que va en el producto en una concentración del 0,3%, lo hacen ideal para potenciar todo tipo de cultivos.

MEZCLAS Y COMPATIBILIDADES

Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.

AVISO LEGAL

La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo no se responsabiliza del mal uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual está destinado única y exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis recomendada en el apartado de "DOSIFICACIÓN", con el fin expuesto en el apartado de "DESCRIPCIÓN". El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Grupo	Dosis Kg/Ha	Modo y época de aplicación
Aromáticas	2-3	Realizar la aplicación a los 15 días tras la germinación hasta la floración.
Cereales	2-3	Realizar la aplicación a los 15 días tras la germinación hasta la floración.
Cítricos	2-3	Realizar aplicaciones mensuales hasta la fructificación.
Forestales	2-3	Realizar aplicaciones mensuales hasta la fructificación.
Frutales	2-3	Realizar aplicaciones mensuales hasta la fructificación.
Hortícolas	2-3	Realizar la aplicación a los 15 días tras la germinación hasta la floración.
Industriales	2-3	Realizar la aplicación a los 15 días tras la germinación hasta la floración.
Ornamentales	2-3	Realizar aplicaciones desde el crecimiento hasta la floración.
Tropicales	2-3	Realizar la aplicación a los 15 días tras la germinación hasta la floración.

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte es Servicio Técnico de Arvensis.

arvensis agro, s.a
Carretera de Castellón Km 212,1 · 50740 Fuentes de Ebro · Zaragoza (SPAIN)
Telf: +34 976 169 181 · Fax: +34 976 169 183 · info@arvensis.com · www.arvensis.com