FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUKAM® Boro

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Composición	(%p/v)
Aminoácidos	7
Boro	4,8

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<0,5	<5,0

RUKAM® Boro, concentrado Soluble (SL).
Suministra a nivel celular Boro, junto con aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular, incorporándose directamente al circuito metabólico, lo que genera una rápida respuesta a nivel celular.

Estimula las funciones naturales de la planta: los sistemas hormonal y enzimático, los mecanismos de resistencia y de respuesta frente a factores de estrés (climático, biológico o químico).

Promueve la germinación del grano de polen y la elongación del tubo polínico, mejorando la cuaja de frutos, aún en condiciones adversas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Integrar el producto al programa de tratamientos cuando se requiera una rápida entrega de Boro a nivel celular. En aplicaciones foliares puede mezclarse con otros fertilizantes de la línea **RUKAM®**, excepto con **RUKAM® Cobre**. En especial se recomienda la mezcla con **RUKAM® Zinc**.

Cultivo	Dosis* L/ha	Aplicaciones Foliares
Vid de mesa y vinífera	1 - 2	2 aplicaciones: en pre-flor y en plena floración. En variedades con problema de cuaja, realizar dos aplicaciones en floración (40% y 80% flor).
Duraznero, Nectarino, Guindo, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Almendro	2 - 3	2 aplicaciones: en botón floral y en postcosecha.
Manzano y Peral	2 - 3	1 a 2 aplicaciones, desde ramillete expuesto hasta inicio de floración. 1 aplicación en postcosecha.
Kiwi	1 - 1,5	1 aplicación a inicios de floración.
Nogal	1,5 - 2	1 aplicación desde yema hinchada a inicio de flor.
Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla	1 - 1,5	2 aplicaciones: en botón floral y a inicio de caída de pétalos. 1 aplicación en postcosecha.
Palto, Cítricos	2 - 3	1 a 2 aplicaciones desde inicios hasta fin de floración.
Olivo	2 - 3	2 aplicaciones: en preflor y en plena floración.
Alfalfa, Trébol	2 - 3	30 días después de la emergencia y de cada corte.
Raps, Lupino	1,5 - 2	1 a 2 aplicaciones desde pre-flor.
Avena, Cebada	2 - 3	1 aplicación a inicios de floración.
Maíz	2 - 3	En pre-flor, a inicios de emisión de seda.
Trigo	2 - 3	A inicios de flor, con espiga emergida antes de antesis.
	cc/100L	
Tomate, Pimiento	150	Dos días antes de la apertura floral de cada racimo.
Lechuga, Apio, Acelga	150-250	10 días post-trasplante.
Brócoli, Coliflor, Repollo	150-250	En pre-flor para producción de semillas.
Betarraga, Remolacha	250-350	15 días post-trasplante. Repetir a los 15-20 días, si aún se observan deficiencias.
Cucurbitaceas	250	En pre-floración

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUKAM® Boro

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de **4 a 6 L / ha** en cada aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar el envase de **RUKAM® Boro,** llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

Los productos **RUKAM®** son de origen natural, prácticamente no tóxicos, no obstante en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.

RUKAM® Boro al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

RUKAM® Boro es compatible con todos los bioestimulantes de la línea **RUKAM®** excepto con **RUKAM® Cobre**. Antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

®: Marca registrada de **MABRUK**

MABRUK® AGRO-INSUMOS

MABRUK *AG* COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Vigencia desde 03 Mayo 2012